

Fac simile foglietto illustrativo

TROSYD® AS

15% ACIDO SALICILICO

GIULIANI

VERRUCHE E MOLLUSCHI

Svolge una rapida azione cheratolitica con assottigliamento dello strato corneo

TROSYD® AS GEL A BASE DI ACIDO SALICILICO AL 15 % PER USO TOPICO

Trosyd® AS, grazie alla presenza dell'Acido Salicilico al 15% in gel alcolico, è in grado di svolgere una rapida azione cheratolitica per via chimica con assottigliamento dello strato corneo. La contemporanea presenza di acido lattico ne potenzia l'effetto cheratolitico, rendendolo equivalente a quello conseguibile normalmente con concentrazioni maggiori di Acido Salicilico.

Trosyd® AS è un prodotto che può trovare facile applicazione ogni qual volta si voglia ottenere un effetto cheratolitico localizzato.

Si presenta sotto forma di un gel fluido trasparente in flacone di vetro con pennello annesso al tappo.

INDICAZIONI D'USO

Trattamento cheratolitico su verruche e molluschi contagiosi. Utile anche nei casi di:

trattamento esfoliante su placche psoriasiche, placche callose cutanee, ittiosi; trattamento cheratolitico in preparazione a interventi di crioterapia.

MODALITÀ D'USO

Applicare in modo uniforme un sottile velo di Trosyd® AS sulle zone da trattare, previa detersione delicata delle stesse facendo attenzione ad evitare le zone circostanti di cute sana.

Il gel asciuga rapidamente lasciando nella zona trattata una sottile patina bianca formata dai depositi dell'Acido Salicilico.

Tale patina bianca potrà essere all'occorrenza rimossa con acqua o soluzione fisiologica.

L'uso pediatrico è consentito solo su indicazione e sorveglianza del medico.

Dopo l'applicazione riporre il tappo ruotandolo in senso orario sino a completa chiusura.

CONTROINDICAZIONI

Non usare in soggetti con accertata o presunta sensibilizzazione all'Acido Salicilico. Evitare l'esposizione al sole o lampade UV durante il trattamento.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, risciacquare a lungo in caso di contatto accidentale. Non applicare su mucose, pelli sensibili e/o infiammate. Non applicare se la cute presenta escoriazioni. Evitare l'uso sul viso e nelle regioni genitali.

In presenza di eccessivo rossore, o bruciore persistente, sospendere l'utilizzo e consultare il proprio medico.

La presenza eventuale di depositi bianchi all'interno del tappo è dovuta alla cristallizzazione dell'Acido Salicilico, è normale e non pregiudica la validità del prodotto.

Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto. Prodotto per uso esterno, non ingerire. Non utilizzare oltre la data di scadenza riportata sulla confezione.

INGREDIENTI

Alcohol, aqua, salicylic acid, lactic acid, hydroxypropyl methylcellulose

FABBRICANTE

Giuliani S.p.A.
Via P. Palagi, 2
20129 Milano

USO ESTERNO

DISPOSITIVO MEDICO

