

**PRIMA DELL'USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI  
CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

QUESTO È UN MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE CHE POTETE USARE PER CURARE DISTURBI LIEVI E TRANSITORI FACILMENTE RICONOSCIBILI E RISOLVIBILI SENZA RICORRERE ALL'AIUTO DEL MEDICO.

PUÒ ESSERE QUINDI ACQUISTATO SENZA RICETTA MA VA USATO CORRETTAMENTE PER ASSICURARE L'EFFICACIA E RIDURNE GLI EFFETTI INDESIDERATI.

▶ PER MAGGIORI INFORMAZIONI E CONSIGLI RIVOLGERSI AL FARMACISTA  
▶ CONSULTARE IL MEDICO SE IL DISTURBO NON SI RISOLVE DOPO UN BREVE PERIODO DI TRATTAMENTO.

**DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

TROSYD 28% Soluzione cutanea per uso ungueale (tioconazolo)

**COMPOSIZIONE**

100 g di soluzione contengono:

**Principio attivo:** Tioconazolo 28 g

**Eccipienti:** Acido undecilenico; Acetato di etile.

**COME SI PRESENTA**

Trosyd 28% Soluzione cutanea per uso ungueale si presenta in forma di soluzione al 28% in flaconcino da 12 ml.

**CHE COSA È**

TROSYD è un antimicotico per uso ungueale e va usato per il trattamento delle infezioni causate dai funghi delle unghie.

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Giuliani Spa

Via Palagi,2 – 20129 Milano

**PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE**

Doppel Farmaceutici – via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore (PC)

**PERCHÈ SI USA**

TROSYD Soluzione cutanea per uso ungueale si usa per le onicomicosi sostenute da dermatofiti e lieviti. Per la concomitante attività antibatterica, è particolarmente indicato nelle infezioni miste.

**QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Gravidanza (vedi “COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO”)

### **COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO**

Anche se l’assorbimento del medicinale dopo applicazione sulle unghie è trascurabile tuttavia la terapia può protrarsi per molti mesi. Per questo motivo Trozyd soluzione cutanea per uso ungueale non deve essere usato durante la gravidanza.

Nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità, evitate di usare il medicinale e consultate il vostro medico.

### **QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE**

Non sono note interazioni con altri farmaci, ma se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

### **E’ IMPORTANTE SAPERE CHE**

L’applicazione di prodotti per uso topico, specie se protratta, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

### **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

#### ◆ **Quando e per quanto tempo**

Il prodotto va applicato sull’unghia infetta e nella regione periungueale due volte al giorno, mattina e sera. Il solvente contenuto in Trozyd asciuga in 5 minuti lasciando una sottile pellicola trasparente ed oleosa. Anche se questa pellicola viene casualmente rimossa ciò non diminuisce l’attività del farmaco. Si consiglia di non usare un bendaggio occlusivo. La durata del trattamento richiesto per ottenere la guarigione, varia da paziente a paziente ed è in relazione all’agente infettante ed all’estensione della lesione. In genere la terapia può durare in media fino a 6 mesi, ma può essere prolungata fino ad un anno.

#### ◆ **Come**

Il prodotto va applicato sull’unghia infetta e nella zona circostante usando l’apposito pennello annesso al tappo.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

### **COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE**

Non sono stati riscontrati casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di TROSYD 28% Soluzione cutanea per uso ungueale avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

## **EFFETTI INDESIDERATI**

In casi molto rari è stata osservata lieve e transitoria irritazione locale. Tuttavia, in presenza di reazioni di ipersensibilità, si dovrà interrompere il trattamento ed istituire una terapia opportuna.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo. Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

## **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini. E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

## **REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

Luglio 2014